

TARANTULA CUBENSIS D6

Flüssige Verdünnung zur Injektion.
Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde



Zusammensetzung:

10 ml enthalten: Wirkstoffe:

Eurypelma spinicrus* Dil. D6 (HAB 1, Vs. 4b)	10 ml
--	-------

*Eurypelma spinicrus ist die wissenschaftliche Bezeichnung für Tarantula cubensis

Sonstige Bestandteile:
Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Tierarzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Zieltierart(en):

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund

Dosierung:

Vor Entnahme Arzneimittel gut durchschütteln. Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind	10 ml
Kalb, Schwein	5 ml
Schaf, Ziege	1-4 ml (max. 4 ml pro Tier)
Hund	0,2 ml pro kg KGW (max. 3 ml pro Tier)

Die Injektion kann nach 4-5 Tagen wiederholt werden. In der Regel reichen 1 bis 2 Injektionen zur Heilung. Die Verabreichung des Medikaments sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege	0 Tage
Essbare Gewebe	0 Tage
Pferd, Rind, Ziege	0 Tage
Milch	0 Tage

Vorsichtsmaßnahmen:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **TARANTULA CUBENSIS D6** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihrem Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/ Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **TARANTULA CUBENSIS D6** bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Tierarzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Haltbarkeit:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verwerfen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Apothekenpflichtig!

Handelsform:

3x 100 ml
1x 100 ml
5x 20 ml



Onkologischer Themenkreis

Tierarzneimittel ohne
Indikationsbindung,
praktisch in der
Handhabung, therapiesicher,
wirtschaftlich, zeitgemäß,
für viele Tierarten
zulässig!