

Equioxx

57mg Firocoxib

FIROCOXIB 57 MG KAUTABLETTE FÜR PFERDE

■ **Wirkmechanismus:** Firocoxib ist ein nichtsteroidales Antiphlogistikum (NSAID), dessen Wirkung auf einer selektiven Hemmung der Cyclooxygenase-2 (COX-2)-vermittelten Prostaglandinsynthese beruht. Die Cyclooxygenase ist verantwortlich für die Bildung von Prostaglandinen. COX-2 ist die Isoform des Enzyms, die primär für die Synthese von prostanoiden Mediatoren von Schmerz, Entzündung und Fieber verantwortlich sein soll. Bei in-vitro Tests mit Vollblut vom Pferd zeigt Firocoxib eine 222- bis 643fach höhere Selektivität für COX-2 im Vergleich zu COX-1.

■ **Anwendungsgebiet(e):** Zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei Osteoarthritis und zur Verringerung der damit verbundenen Lahmheit bei Pferden.

■ **Dosierung:** Zum Eingeben in die Maulhöhle. Eine Tablette Pferden mit 450 - 600 kg Körpergewicht einmal täglich verabreichen. Die Dauer der Behandlung hängt vom beobachteten Behandlungserfolg ab, sollte jedoch nicht über 14 Tage hinausgehen.

■ **Hinweise für die richtige Anwendung:** Eine Tablette sollte mit einer kleinen Menge Futter in einem Eimer oder direkt mit der Hand, kombiniert mit etwas Futter oder einer Belohnung auf der Handfläche, angeboten werden. Nach der Verabreichung sollte die Maulhöhle untersucht werden, um sicher zu gehen, dass die Tablette sicher abgeschluckt wurde.

■ **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen und Blutungen, eingeschränkter Leber-, Herz- oder Nierenfunktion sowie Blutgerinnungsstörungen. Nicht bei Zuchttieren und trächtigen oder laktierenden Stuten anwenden. Nicht gleichzeitig mit Kortikosteroiden oder anderen NSAIDs anwenden. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

■ **Nebenwirkungen:** Läsionen (Erosionen/Ulzerationen) der Mundschleimhaut und der das Maul umgebenden Haut wurden bei in Verträglichkeitsstudien behandelten Tieren sehr häufig beobachtet. Diese Läsionen waren geringgradig und heilten ohne Behandlung ab. In einer Feldstudie waren die oralen Läsionen selten mit Speicheln oder Lippen- und Zungenödemen verbunden. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert / Sehr häufig häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung), Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren), Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren), Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren), Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte). Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

■ **Doping positiv:** 14 Tage.

■ **Wartezeit:** Essbare Gewebe: 26 Tage. Nicht zugelassen zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

■ **Packungsgrößen erhältlich:** • 1 Faltschachtel mit 60 Tabletten in einer 30ml Dose.
• 1 Faltschachtel mit 10 Tabletten in Blistern.

■ **Arzneimittelleinstufung für die Abgabe:** Abgabe nur auf Rezept.



Zusammensetzung

Firocoxib 57 mg