

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie mit niedrigem Fettgehalt.

HAUPTVORTEILE



Niedriger Fettgehalt
Mit niedrigem Fettgehalt und leicht-verdaulich zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie.



MCT
Enthält eine spezielle Fettquelle, die reich an mittelkettigen Triglyceriden (MCTs) ist, die leicht absorbierbar ist.



Mikrobiom Unterstützung
Hinzugefügtes Präbiotikum (Inulin), um zu helfen, das Gleichgewicht des Mikrobioms zu verbessern.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

Protein	24,0 %
Fettgehalt	7,5 %
Rohasche	7,5 %
Rohfaser	2,0 %
Mittelkettige Fettsäuren	0,75 %

ZUSAMMENSETZUNG

Reis, Mais, Erbsenprotein, Getrocknetes Geflügelprotein, Maisstärke, Sojaprotein, Mineralstoffe, Autolysat, Getrocknete Rübenschnitzel, Gerste, Raffiniertes Kokosnussöl (Quelle für MCTs), Tierische Fette, Fischöl, Chicorée-Inulin (0,55 %), Monoglyceride.


ZUSÄTZLICHE VORTEILE

- Leicht verdauliche Zutaten fördern einen wohlgeformten Stuhl.
- Hilft bei der Regulierung des Magen-Darm-Trakts und der Nährstoffversorgung der Enterozyten.
- Hinzugefügte langkettige Omega-3-Fettsäuren helfen, natürliche entzündungshemmende Prozesse zu unterstützen.
- Enthält einen hohen Anteil an Vitamin E und C um zu helfen, oxidativen Stress zu reduzieren.
- Hilft, Elektrolytverluste bei Erbrechen und Durchfall durch ausreichende Elektrolytversorgung auszugleichen



FETT IST WICHTIG

Bei Hunden mit Magen-Darm-Störungen kommt es häufig zu einer Fettmalassimilation, welche die Darmgesundheit noch weiter beeinträchtigen kann¹:




Eine fettreduzierte Ernährung kann helfen, das Risiko einer solchen Malassimilation zu minimieren, aber bestimmte Bedingungen erfordern noch niedrigere Fettgehalte:



PANKREATITIS

Nahrungsfett kann die Freisetzung von Pankreasenzymen stimulieren, was eine Pankreatitis verschlimmern kann.⁵



PROTEINVERLUSTENTEROPATHIE

Übermäßiger Fettkonsum kann den Lymphdruck erhöhen und so die Leckage aus beschädigten Gefäßen bei Lymphangiectasien verschlimmern, was den Proteinverlust und die Entzündung verstärkt.⁶



HYPERLIPIDÄMIE

Eine fettarme Ernährung reduziert die Fettaufnahme und hilft dabei, die Blutfettwerte zu normalisieren.⁷

WUSSTEN SIE SCHON...

„Die Fütterung von Diäten mit einem höheren Anteil an mittelkettigen Triglyceriden (MCTs) kann helfen Entzündungsreize verringern und gleichzeitig die positiven Aspekte der Nahrungslipide bewahren.“⁶

¹ Guilford, G. (1994). Nutritional Management of Gastrointestinal Tract Diseases of Dogs and Cats. The Journal of Nutrition, 124: 2663S - 2669S. https://doi.org/10.1093/jn/124.suppl_12.2663S.

² Zoran D. (2003). Nutritional Management of Gastrointestinal Disease. Clinical Techniques in Small Animal Practice, 18 (4): 211-217.

³ Schauf, S. et al. (2018). Effect of dietary fat to starch content on fecal microbiota composition and activity in dogs, Journal of Animal Science, 96 (9): 3684-3698, <https://doi.org/10.1093/jas/sky264>

⁴ Belchik, SE, et al. (2023). PSIX-3 A Veterinary Gastrointestinal Low-Fat Diet Affects Fecal Characteristics, Metabolites, Bile Acids, and Microbiota Concentrations of Antibiotic-Treated Dogs, Journal of Animal Science, 101 (3): 442-443, <https://doi.org/10.1093/jas/skad281.526>

⁵ Zhang, Y. et al. (2023). Impact of fatty acid composition on markers of exocrine pancreatic stimulation in dogs. Plos one, 18(8), e0290555.

⁶ Melzer, KJ and Sellon, RK (2002). Canine intestinal lymphangiectasia. Compendium on continuing education for the practising veterinarian. 24 (12): 953-961.

⁷ Xenoulis, PG and Steiner, JM (2015). Canine hyperlipidaemia. Journal of Small Animal Practice, 56 (10): 595-605.

NUR FÜR TIERÄRZTLICHE VERWENDUNG



Ihr Haustier, unsere Leidenschaft.®