



PROCAPEN

Injektionssuspension für Rinder,
Schweine und Pferde

Wirkstoff: Benzylpenicillin, Procain Monohydrat

- exzellente Resuspendier- und Spritzbarkeit
- sehr gute Empfindlichkeitslage bei zahlreichen gram+ Erregern
- keine Antibiotamppflicht

Along with you

aniMedica GmbH · a LIVISTO company · Im Südfeld 9 · 48308 Senden

livisto.com · livisto-shop.de

PROCAPEN

300 mg/ml

Wirkstoff: Benzylpenicillin, Procain Monohydrat
verschreibungspflichtig

Anwendungsgebiete:

Rinder, Kälber und Pferde:

Allgemeine bakterielle Infektionen (Septikämien).
Infektionen

- der Atmungsorgane
- des Harn- und Geschlechtsapparates
- der Haut, Klauen und Hufe
- der Gelenke

Dosierung und Art der Anwendung:

Die Behandlungsdauer beträgt 3 bis 7 Tage mit jeweils einer Injektion, die im Abstand von 24 h zu verabreichen ist.

TIERART	APPLIKATION	DOSIERUNG	WARTEZEIT
Rinder	i.m.	ca. 1 ml Procapen/15 kg KGW ($\hat{=}$ 20 mg Procain-Benzylpenicillin/kg KGW)	Essbare Gewebe: 14 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage 16 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage
Kälber		ca. 0,75–1 ml Procapen/15 kg KGW ($\hat{=}$ 15–20 mg Procain-Benzylpenicillin/kg KGW)	Milch: 6 Tage
Schweine		ca. 1 ml Procapen/15 kg KGW ($\hat{=}$ 20 mg Procain-Benzylpenicillin/kg KGW)	Essbare Gewebe: 15 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage 17 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage
Pferde		ca. 0,5 ml Procapen/10 kg KGW ($\hat{=}$ 15 mg Procain-Benzylpenicillin/kg KGW)	Essbare Gewebe: 14 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage 16 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Fachinformation.

PRODUKT	HANDELSFORM	NOTIZEN
PROCAPEN 300 mg/ml	100 ml	



Bestellen Sie jetzt:

Online-Bestellung: livisto-shop.de
E-Mail: animedica-sales@livisto.com
Telefon: 02536 3302-21
Fax: 0800 2646-334

Folgen Sie uns auf:

 @LivistoAlongwithpets
 @livisto_alongwithpets
 @LIVISTO Deutschland

Basisinformation:

