

TARANTULA-logoplex®

Flüssige Verdünnung zur Injektion.

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

 **ZIEGLER**
Homöopathika ad us. vet.
Natürlich bewährte Tierarznei



Zusammensetzung:

10 ml enthalten: Wirkstoffe:

Tarantula Dil. D6	1,0 g
Acidum silicicum Dil. D6	1,0 g
Hepar sulfuris Dil. D8	1,0 g
Pyrogenium-Nosode Dil. D8 (HAB; Vs. 44)	1,0 g

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid	0,09 g
Wasser für Injektionszwecke	5,91 g

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Tierarzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Dosierung:

Vor Entnahme Arzneimittel gut durchschütteln. Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind	10 ml
Kalb, Schwein	5 ml
Schaf, Ziege	3 ml
Hund	0,2 ml pro kg KGW (max. 3 ml pro Tier)
Katze	0,2 ml pro kg KGW (max. 1 ml pro Tier)

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf ist die angegebene Dosierung nach 24 Stunden zu wiederholen. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege
Essbare Gewebe

0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege
Milch

0 Tage

Vorsichtsmaßnahmen:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Tierarzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **TARANTULA-logoplex®** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihrem Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/ Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **TARANTULA-logoplex®** bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Haltbarkeit:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verwerfen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Apothekenpflichtig!

Handelsform:

5x 100 ml
1x 100 ml
5x 20 ml



Klauen • Gewebe

Tierarzneimittel ohne
Indikationsbindung,
praktisch in der
Handhabung, therapiesicher,
wirtschaftlich, zeitgemäß,
für viele Tierarten
zulässig!